Somali Rapport national destiné au Comité scientifique de la Commission des Thons de l'Océan Indien, 2026

Résumé exécutif

Les pêcheries somaliennes ciblant les espèces CTOI sont de petite échelle et opèrent depuis la côte, dans les eaux nationales. En 2025, le ministère des Pêches et de l'Économie bleue (MFBE) a surveillé les débarquements sur 16 sites situés entre 1,6° S et 11,3° N, couvrant 12 586 des 48 400 sorties de l'univers d'échantillonnage national (26 %). Les données de captures conservées, de capture et effort, et de fréquences de taille pour 2025 sont parvenues au Secrétariat de la CTOI le 30 juin 2026.

Les captures conservées d'espèces CTOI sont estimées à 112 870 t. Les thons tropicaux en ont représenté 45,8 %, dominés par l'albacore (32 816 t), tandis que les thons néritiques et les thazards représentaient 31,0 %, les istiophoridés et l'espadon (poissons porte-épée) 18,4 %, les requins 4,1 % et le germon 0,7 %. Les filets maillants dérivants (38,0 %) et les lignes à main (35,0 %) ont assuré l'essentiel des débarquements, sur 182 529 jours de pêche. La part des thons tropicaux a été plus importante durant la mousson du nord-est.

Les captures des quatre principaux thons ont été supérieures de 74 % à celles de 2024, et celles d'albacore de 76 %. Cette hausse fait suite à l'extension du suivi de six à 16 sites de débarquement et met en évidence des captures qui n'étaient pas enregistrées tandis que les statistiques nationales étaient reconstituées après l'effondrement du gouvernement central. Les estimations de 2025 inaugurent une nouvelle série, plus complète.

Les échantillonneurs ont mesuré 43 320 poissons appartenant à 21 espèces. Après élimination des longueurs biologiquement invraisemblables, l'albacore présentait une longueur médiane à la fourche de 107,5 cm, et 90 % des individus dépassaient la longueur à 50 % de maturité.

La composition spécifique n'est pas encore résolue par engin, et les captures et l'effort ne sont pas encore répartis par grille. Le MFBE révise la procédure d'extrapolation par strate d'engin et mène en 2026 des vérifications d'identification des istiophoridés et des petits thons, un plan d'échantillonnage des mobulidés et l'élaboration d'un NPOA-Requins, tout en ajoutant deux sites de débarquement afin de parvenir à une couverture complète des 25 principaux sites.